

⊕ SAÚDE
⊕ ALEGRIA
⊕ FUTURO

MEDICAMENTOS

Malária

PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO



De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 3,3 mil milhões de pessoas estão em risco de contrair malária durante a sua vida, em particular nos países mais pobres e com climas tropicais. Estima-se que a incidência anual desta doença seja superior a 500 milhões de novos casos, sendo responsável por mais de um milhão de mortes por ano.

O diagnóstico precoce e preciso da malária é essencial para o tratamento eficaz da doença e a vigilância da malária.

A OMS recomenda a confirmação parasitológica imediata do diagnóstico por microscopia ou teste de diagnóstico rápido de malária em todos os pacientes com suspeita de malária antes do tratamento ser administrado.

As infecções por malária podem ser tratadas com medicamentos antimaláricos e prevenidas com algumas medidas simples.

A OMS recomenda o uso de terapia de combinação baseada em artemisinina (ACT) nos casos de malária falciparum resistente aos medicamentos.

A Elnor Pharma oferece uma gama completa de medicamentos antimaláricos, incluindo combinações de dose fixa e produtos para malária severa.



PREVENÇÃO

Medidas preventivas para Países onde a malária é endémica, a prevenção é muito importante no seu controlo: Redes Mosquiteiras tratadas com insecticida (MILD), todos aprovados pela OMS e disponíveis em diferentes cores e tamanhos; Medicamentos de Profilaxia e Repelentes.

- ⊕ Rede Mosquiteira com Insecticida 130x180x150 cm e 190x180x150 cm
- ⊕ Sulfadoxina 500 mg / Pirimetamina 25 mg (1000 COMPRIMIDOS)
- ⊕ Repelentes em Spray

DIGNÓSTICO

O diagnóstico precoce e preciso é essencial para evitar a progressão da doença. Testes rápidos: todos com marcação CE e aprovados pela OMS.

- ⊕ Malaria P.falciparum + Pan rapid test First Response Ag (116FRC25)
- ⊕ Malaria P.falciparum rapid test First Response Ag (113FRC25)
- ⊕ Malaria P.falciparum + Pan rapid test SD Bioline Ag (05FK60)
- ⊕ Malaria P.falciparum + P.vivax rapid test SD Bioline Ag (05FK80)
- ⊕ Malaria P.falciparum rapid test SD Bioline Ag (05FK50)

Incluem: 25 testes por caixa; 25 lancetas estéreis; 25 toalhitas de álcool; 1 frasco de diluente; 1 instruções de uso. Amostra: Sangue Total; Luvas de Exame disponíveis em separado; caixas de 100 unidades.

TRATAMENTO

A OMS recomenda que se inicie o tratamento imediatamente após o surgimento dos sintomas e realizado o diagnóstico. Medicamentos antimaláricos: terapias combinadas de derivados da Artemisina, co-blisters e combinações de doses fixas.

- ⊕ Artemeter 80 mg/ml Injectável (30 AMPOLAS)
- ⊕ Artemeter 20 mg / Lumefantrina 120 mg (30 X 24 COMPRIMIDOS BLISTER)
- ⊕ Artemeter 20 mg / Lumefantrina 120 mg (30 X 18 COMPRIMIDOS BLISTER)
- ⊕ Artesunato 100 mg / Amodiaquina 270 mg (25 X 3 COMPRIMIDOS BLISTER)
- ⊕ Artesunato 100 mg / Amodiaquina 270 mg (25 X 6 COMPRIMIDOS BLISTER)
- ⊕ Artesunato 25 mg / Amodiaquina 67,5 mg (25 X 3 COMPRIMIDOS BLISTER)
- ⊕ Artesunato 60 mg pó para Injecção + 2 solventes, 1 Frasco
- ⊕ Quinina 600 mg/2 ml (10 X 10 AMPOLAS)
- ⊕ Quinina (sulfato) 300 mg (1000 COMPRIMIDOS REVESTIDOS)

Sede: Rua João de Barros, n.º42, Luanda, Angola
Filial: Rua Irmão Evaristo, n.º51, Cabinda, Angola

www.elnorpharma.com
info@elnorpharma.com



919 418 571